

# Visste du at 3-kammerposene med parenteral ernæring finnes i 14 ulike varianter?

- SmofKabiven®**
- SmofKabiven®** Elektrolytfri
- SmofKabiven®** extra Nitrogen
- SmofKabiven®** extra Nitrogen Electrolyte free
- SmofKabiven®** Perifer



# Parenteral ernæring i 3-kammerpose



Pasienter har ulike behov



## Utvalgte parametere

Innhold	SmofKabiven	SmofKabiven extra Nitrogen	SmofKabiven Perifer
Aminosyrer (g/l)	51	66	32
Nitrogen (g/l)	8	11	5
Lipider (g/l)	38	29	28
Glukose (g/l)	127	85	71
Osmolalitet (mosmol/kg vann)	1800	1600	950

14 varianter å velge mellom

		kcal per pose
Sentral intravenøs infusjon	SmofKabiven	550
		1100
		1600
		2200
		2700
	SmofKabiven Elektrolytfri	1100
		1600
	SmofKabiven extra Nitrogen	900
		1350
		1800
SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte free	900	
Perifer intravenøs infusjon	SmofKabiven Perifer	800
		1000
		1300

## Blandbarhet og forlikelighet



Blandbarhet er testet for mange tilsetninger.

Last ned innholds- og tilsetningsguide ved å skanne QR-koden, eller ta kontakt med en av produktspecialistene om du ønsker å få den tilsendt.



## Instruksjonsfilm



Se instruksjonsfilm for håndtering av våre trekammerposer ved å skanne QR-koden (scroll deretter ned på nettsiden).



## Avtale et møte, eller har du spørsmål?



**Produktspecialist**

**Grethe Misvær**  
Intensivsykepleier

977 17 680  
grethe.misvar@fresenius-kabi.com

**Medisinsk informasjon**

225 88 000  
norway.medinfo@fresenius-kabi.com



**Produktspecialist**

**Gina Elisabeth Mathisen**  
Bachelor i ernæring

906 50 744  
gina.mathisen@fresenius-kabi.com

**Produktsjef parenteral ernæring**

Trude Tangen Volla  
Cand. scient  
915 89 856  
trude.volla@fresenius-kabi.com

# Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjon



**SmofKabiven, SmofKabiven extra Nitrogen, SmofKabiven Perifer** (aminosyrer, elektrolytter, glukose og lipider), **SmofKabiven Elektrolytfri, SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte free** (aminosyrer, glukose og lipider). Parenteral ernæring i trekammerpose.

## Indikasjon

Parenteral ernæring til voksne og barn > 2 år når oral eller enteral ernæring er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert.

## Dosering

Pasientens evne til å eliminere lipider, metabolisere nitrogen og glukose samt pasientens ernæringsbehov bør styre dosering og infusjonshastighet. Dosen bør individuelt tilpasses til pasientens kliniske tilstand, kroppsvekt, ernærings- og energibehov, med dosejustering basert på ekstra oralt/enteralt inntak. For informasjon om dosering, infusjonshastighet og -varighet og bruk hos spesielle pasientgrupper, se SPC pkt. 4.2 og 4.4. For fullstendig parenteral ernæring, må sporelementer, vitaminer og ev. ekstra elektrolytter tilsettes etter behov.

## Administrering

Intravenøs infusjon. Alle varianter kan gis i sentral vene. Kun SmofKabiven Perifer kan gis i perifer vene. Innholdet i trekammerposen må blandes før administrering.

## Pakninger, priser, reseptgruppe og finansiering

Reseptgruppe: C

Pakninger og priser (AUP):

Infusjonsvæske, emulsjon: SmofKabiven: 6 x 493 ml (550 kcal) kr 1926,20, 4 x 986 ml (1100 kcal) kr 1989,10, 4 x 1477 ml (1600 kcal) kr 2296,30, 4 x 1970 ml (2200 kcal) kr 2559,60, 3 x 2463 ml (2700 kcal) kr 2242,10. SmofKabiven Elektrolytfri: 4 x 986 ml (1100 kcal) kr 1618,60, 4 x 1477 ml (1600 kcal) kr 1954,00. SmofKabiven extra Nitrogen: 4 x 1012 ml (900 kcal) kr 3347,10, 4 x 1518 ml (1350 kcal) kr 3845,20, 4 x 2025 ml (1800 kcal) kr 4885,50. SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte free: 4 x 1012 ml (900 kcal) kr 4111,50. SmofKabiven Perifer: 4 x 1206 ml (800 kcal) kr 1660,10, 4 x 1448 ml (1000 kcal) kr 2153,70, 4 x 1904 ml (1300 kcal) kr 2153,70.

Inngår i Sykehusinnkjøp HF anskaffelse 2403. Kan forskrives på H-resept.

## Utvalgt sikkerhetsinformasjon

- **Kontraindikasjoner:** Overfølsomhet for egg-, fisk-, peanøtt- eller soyaprotein, alvorlig hyperlipidemi, alvorlig nedsatt leverfunksjon, alvorlige koagulasjonsforstyrrelser, medfødte forstyrrelser i aminosyremetabolismen, alvorlig nedsatt nyrefunksjon når hemofiltrasjon eller dialyse ikke er tilgjengelig, akutt sjokk, ukontrollert hyperglykemi, hemofagocytotisk syndrom, ustabile tilstander, spedbarn/barn < 2 år og generelle kontraindikasjoner ved infusjonsbehandling. SmofKabiven, SmofKabiven extra Nitrogen, SmofKabiven Perifer: Patologisk forhøyet serumnivå av en av elektrolyttene i emulsjonen.
- For å unngå risiko ved for høy infusjonshastighet, anbefales kontinuerlig og godt kontrollert infusjon, om mulig ved bruk av infusjonspumpe.
- Hos underernærte pasienter bør oppstart skje forsiktig.
- Brukes med forsiktighet hos pasienter med påvirket fettmetabolisme, laktacidose, utilstrekkelig cellulær oksygentilførsel eller forhøyet serumosmolaritet.
- Triglyseridkonsentrasjonen i serum overvåkes under infusjon.
- Serumglukose, elektrolytter, osmolaritet, væskebalanse, syrebasestatus og resultater av leverenzymtester bør kontrolleres regelmessig.
- SmofKabiven, SmofKabiven Extra Nitrogen og SmofKabiven Perifer: Brukes med forsiktighet ved tendens til elektrolyttretensjon. Forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalansen korrigeres før oppstart. Fosfat- og kaliumtilførsel kontrolleres ved nyresvikt eller nedsatt nyrefunksjon.
- Blodcelletelling og koagulasjon bør overvåkes ved bruk over en lengre periode.
- Gravitet/ammning: Gis til gravide og ammende kun etter nøye vurdering.

Basert på SPCer godkjent 01.03.2024.

For utfyllende produktinformasjon se:  
[Felleskatalogen.no](https://www.fresenius-kabi.no) eller [DMP.no](https://www.dmp.no)

1) Farmastat, volumer av trekammerposer med parenteral ernæring til voksne og barn > 2 år (ATC-kode B05B A10) solgt i Norge i 2024.